



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 184 031 A2**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:
06.03.2002 Bulletin 2002/10

(51) Int Cl.7: **A61K 7/50, C11D 7/00**

(21) Numéro de dépôt: **01401904.6**

(22) Date de dépôt: **16.07.2001**

(84) États contractants désignés:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
États d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorité: **31.08.2000 FR 0011130**

(71) Demandeur: **L'OREAL
75008 Paris (FR)**

(72) Inventeurs:
• **Picard-Lesboueyries, Elisabeth
78140 Velizy (FR)**
• **Gullou, Véronique
92160 Antony (FR)**

(74) Mandataire: **Rasson, Catherine et al
L'OREAL-DPI 6 rue Bertrand Sincholle
92585 Cllichy Cedex (FR)**

(54) **Crème cosmétique moussante pour le traitement des peaux grasses**

(57) La présente demande concerne une composition moussante pour application topique, contenant (1) un système tensioactif tel qu'au moins une phase paracristalline hexagonale directe ou cubique apparaisse quand la température augmente au-delà de 30°C et que cette phase paracristalline reste présente jusqu'à au moins 45°C et (2) un actif choisi parmi les antibiotiques et les agents antiséborrhéiques.

Le système tensioactif permettant d'obtenir l'apparition d'une telle phase paracristalline comprend de pré-

férence au moins un tensioactif hydrosoluble et au moins un tensioactif insoluble dans l'eau. Il comporte de préférence au moins un savon hydrosoluble.

Ces compositions se présentent sous forme de crèmes ayant une bonne stabilité physique à température ambiante et même jusqu'à au moins 45°C. Elles peuvent être utilisées dans les domaines cosmétique ou dermatologique, pour le nettoyage ou le traitement des peaux grasses et/ou à tendance acnéique.

EP 1 184 031 A2

Description

[0001] La présente invention se rapporte à une composition moussante rinçable constituant une crème pour application topique, contenant un système tensioactif particulier et un actif antibiotique ou antiséborrhéique, et présentant une bonne stabilité physique jusqu'à au moins 45°C, ainsi qu'à son utilisation dans les domaines cosmétique ou dermatologique, notamment pour le nettoyage ou le traitement des peaux grasses et/ou à tendance acnéique.

[0002] Le nettoyage de la peau est très important pour le soin du visage. Il doit être le plus performant possible car les résidus gras tels que l'excès de sébum, les restes des produits cosmétiques utilisés quotidiennement et les produits de maquillage notamment les produits « waterproof » résistants à l'eau, s'accumulent dans les replis cutanés et peuvent obstruer les pores de la peau et entraîner l'apparition de boutons.

[0003] Les peaux grasses et/ou à tendance acnéique nécessitent un nettoyage adapté capable d'éliminer parfaitement le sébum, de purifier la surface de la peau et de nettoyer les pores en profondeur. La peau grasse ou hyperséborrhéique se caractérise par une peau luisante, parfois d'aspect huileux, épaisse, aux pores pilosébacés dilatés. En outre, elle favorise la desquamation. L'hypersécrétion sébacée est le plus souvent liée à une hyperandrogénie due soit à une hyperproduction d'androgènes par une glande endocrine, soit à une hyperproduction périphérique au niveau de la glande sébacée à partir des androgènes et/ou proandrogènes environnants. L'androgène qui induit la synthèse lipidique au niveau du noyau du sébocyte est la dihydrotestostérone (DHT) qui provient de la réduction de la testostérone par la 5 alpha réductase. L'aspect général de la peau est granuleux, et suivant les cas, la peau peut présenter des imperfections bien connues telles que points blancs, points noirs, petits boutons, microkystes sébacés, qui sont bien souvent des préludes à l'installation d'affections acnéiques.

[0004] Par ailleurs, l'acné vulgaris, appelé communément acné, est un désordre cutané affectant un grand nombre de personnes. Il se développe notamment chez les personnes présentant une hyperséborrhée. L'acné se produit lorsque les follicules sébacés, localisés sur la face et le dos, deviennent obstrués par le sébum et les cellules épithéliales. L'obstruction du follicule crée un micro-comédon qui peut évoluer en comédon ou en lésion inflammatoire. Une bactérie résidente anaérobie, *Propioni bacterium acnes*, prolifère dans cet environnement riche en sébum et en cellules folliculaires. Cette bactérie peut produire localement une inflammation, par la libération de lipases qui conduit à la formation d'acides gras libres. Ces derniers sont eux-mêmes comédogènes et irritants primaires. En effet des facteurs chimiotactiques sont sécrétés par *P. acnes* et agissent par attraction des neutrophiles de la paroi folliculaire.

[0005] Des actifs spécifiques pour peaux grasses,

tels que par exemple l'acide salicylique, le peroxyde de benzoyle ou le triclosan, sont utilisés dans des compositions de nettoyage de la peau pour éviter l'apparition de tels phénomènes. On connaît plusieurs types de produits de nettoyage de la peau grasse, et notamment les lotions et les gels aqueux détergents moussants. Ces produits ont une action nettoyante grâce aux tensioactifs qui mettent en suspension les résidus gras et les pigments des produits de maquillage. Ils sont efficaces et agréables à utiliser du fait qu'ils moussent et qu'ils sont facilement éliminés. Toutefois, ils sont généralement assez fluides, et il est difficile de les épaissir tout en gardant de bonnes propriétés moussantes.

[0006] Pour obtenir de bonnes performances moussantes tout en ayant une composition épaisse, on a cherché à préparer des crèmes moussantes. On entend ici par « crèmes moussantes » des compositions opaques, visqueuses, souvent commercialisées en tube et constituées généralement d'un milieu aqueux contenant un mélange de tensioactifs tels que les sels d'acides gras (savons) ou les tensioactifs synthétiques anioniques, non ioniques, amphotères, et d'autres additifs tels que par exemple des polymères, des polyols, des charges. Ces crèmes destinées en particulier au nettoyage de la peau développent de la mousse quand elles sont mélangées avec de l'eau. Elles peuvent être utilisées de deux façons :

- la première utilisation consiste à étaler la crème dans les mains, à l'appliquer sur le visage ou sur le corps puis à la masser en présence d'eau pour développer la mousse directement sur le visage ou le corps.
- l'autre utilisation possible de ce type de produit consiste à développer la mousse dans les paumes des mains avant d'être appliquée sur le visage ou le corps.

Dans les deux cas, la mousse est ensuite rincée.

[0007] Toutefois, la plupart des crèmes moussantes actuellement sur le marché présentent l'inconvénient d'être instables à chaud, c'est-à-dire au-dessus de 40°C. Cela signifie que, si elles sont entreposées quelques jours à cette température, elles présentent une démixtion macroscopique, aboutissant à une séparation en au moins deux phases. Les crèmes ainsi demixées à une température nettement supérieure à la température ambiante se révèlent hétérogènes après retour à la température ambiante et donc inutilisables du fait de la dégradation de la texture et des propriétés moussantes. On entend ici par température ambiante une température tempérée, c'est-à-dire d'environ 20 à 25°C. Une telle instabilité est dommageable pour la conservation de la crème elle-même mais aussi pour la stabilité de l'actif ou des actifs qu'elle contient.

[0008] En effet, il est indispensable que ce type de produit soit stable sur une large plage de températures car, au cours de sa vie, le produit peut être exposé à

des températures allant de -20°C à +45°C minimum selon les conditions de climat, de stockage et/ou de transport. Par exemple, il faut qu'une crème transportée dans une voiture qui risque de rester longtemps sous le soleil, c'est-à-dire à une température atteignant facilement 50°C, conserve sa stabilité. Il faut aussi que ces crèmes moussantes puissent être utilisées dans les pays chauds sans que leur transport et leur conservation ne posent de problème.

[0009] Il est bien connu qu'il est possible d'empêcher cette séparation de phases d'une crème moussante en augmentant, par addition de polymères ou de charges, la consistance du produit soumis à des températures de +40° à +45°C. Toutefois, dans ce cas, le produit devient très rigide à température ambiante tempérée et ne correspond plus aux propriétés recherchées pour l'application sur la peau, et notamment il devient difficile de le mélanger à l'eau et de le faire mousser.

[0010] Il subsiste donc le besoin d'une crème moussante destinée au traitement des peaux grasses ou à tendance acnéique, stable jusqu'à au moins 45°C, dont l'aspect de crème soit maintenu à température ambiante même après passage à une température plus élevée et ayant de bonnes caractéristiques de moussage.

[0011] La demanderesse a découvert de manière surprenante qu'on pouvait atteindre le but de l'invention et obtenir une composition moussante se présentant sous forme d'une crème et ayant une bonne stabilité, même à des températures de +40 - +45°C, en utilisant un système tensioactif tel qu'au moins une phase paracristalline de type hexagonale directe ou cubique apparaisse quand ladite composition est chauffée à une température supérieure à 30°C et que cette phase paracristalline reste présente jusqu'à au moins 45°C.

[0012] Le fait qu'une phase paracristalline de type hexagonale directe ou cubique apparaisse quand ladite composition est chauffée à une température supérieure à 30°C et que cette phase paracristalline reste présente jusqu'à au moins 45°C signifie que cette phase est présente à une température comprise entre 30°C et au moins 45°C.

[0013] Pour obtenir la stabilité requise, on préfère que la phase paracristalline formée (ou cristal liquide) soit du type phase hexagonale directe. Il n'est pas nécessaire que cette phase paracristalline soit présente à température ambiante mais elle doit impérativement apparaître au delà d'une température comprise entre 30°C et 45°C.

[0014] Les crèmes moussantes, qui ne présentent pas une organisation de phases, telle que citée ci-dessus, ne sont généralement pas stables à 45°C. A cette température, elles subissent une démixtion macroscopique entre au moins deux phases et elles sont ensuite inappropriées à l'utilisation recherchée quand elles sont de nouveau à la température ambiante.

[0015] Ainsi, la présente demande a pour objet une composition moussante constituant une crème pour application topique, contenant dans un milieu aqueux, (1)

un système tensioactif tel qu'au moins une phase paracristalline de type hexagonale directe et/ou cubique apparaisse quand la température augmente au-delà de 30°C et que cette phase paracristalline reste présente jusqu'à au moins 45°C, (2) un actif choisi parmi les actifs antiséborrhéiques et les antimicrobiens.

[0016] La composition obtenue constitue une crème opaque qui a de très bonnes propriétés cosmétiques (douceur, onctuosité), mousse bien et a une bonne stabilité pendant longtemps et à températures élevées.

[0017] Les compositions obtenues sont particulièrement bien adaptées à l'élimination du sébum et au nettoyage des pores qui constituent les points majeurs de la problématique de la peau grasse en matière de nettoyage.

[0018] La ou les phases paracristallines présentes au-delà de +30°C peuvent être de type hexagonale directe ou cubique, ou être un mélange de ces deux phases ou un mélange d'une de ces phases ou de ces deux phases avec une phase de type lamellaire. La ou les phase(s) paracristalline(s) comporte(nt) de préférence au moins une phase hexagonale directe.

[0019] On donne dans la présente demande aux termes de phase lamellaire, phase hexagonale directe et phase cubique, les sens que leur donne habituellement l'homme du métier.

[0020] Ainsi, on entend par phase lamellaire (phase D selon EKWALL, voir *Advances in Liquid Crystals*, vol. 1, page 1-143, Acad. Press, 1975, Ed. G.H. Brown), une phase cristal liquide à symétrie plane, comprenant plusieurs bicouches d'amphiphile disposées en parallèle et séparées par un milieu liquide qui est généralement de l'eau.

[0021] On entend par phase hexagonale directe (phase F selon EKWALL, voir *Advances in Liquid Crystals*, vol. 1, page 1-143, Acad. Press, 1975, Ed. G.H. Brown), une phase cristal liquide correspondant à une arrangement hexagonal de cylindres parallèles constitués d'un amphiphile et séparés par un milieu liquide qui est généralement de l'eau. Dans une phase hexagonale directe, le milieu continu est aqueux.

[0022] On entend par phase cubique, une phase organisée d'une manière bi-polaire en domaines hydrophile et lipophile distincts, en contact étroit et formant un réseau tridimensionnel à symétrie cubique thermodynamiquement stable. Une telle organisation a été notamment décrite dans "La Recherche", Vol.23, pp. 306-315, Mars 1992 et dans "Lipid Technology", Vol.2, n°2, pp.42-45, Avril 1990. Selon l'arrangement des domaines hydrophile et lipophile, la phase cubique est dite de type normal ou inverse. Le terme de phase cubique utilisé selon la présente invention regroupe bien entendu les différents types de phases cubiques.

[0023] Une description plus précise de ces phases peut être trouvée dans la *Revue Française des Corps Gras*, n°2, Février 1969, p 87 à 111, (Lachamp et Vila, « Textures des phases paracristallines »).

[0024] Pour identifier les phases constitutives de la

crème, on peut utiliser différentes techniques, et notamment (1) les mesures par diffraction des rayons-X aux petits angles et aux grands angles et (2) l'observation par microscopie optique en lumière polarisée.

Technique de diffraction des rayons-X

[0025] La technique de diffraction des rayons-X est connue comme étant l'une des plus pertinentes pour mettre en évidence les organisations de phases paracrystallines, en particulier au sein d'un échantillon. Les mesures par diffraction des rayons X peuvent être effectuées à l'aide d'un générateur CGR Sigma 2060 équipé d'un tube Inel à anticathode Cu et d'une chambre à focalisation linéaire montée en transmission symétrique. Les échantillons sont introduits à température ambiante dans une cellule de mesure obturée par des fenêtres en Mylar ou en Capton et placée dans un porte-échantillon thermorégulé.

[0026] Les spectres de diffraction obtenus avec une longueur d'onde $\lambda = 1,54$ Angströms (Raie $K\alpha$ du cuivre) sont enregistrés à l'aide d'un écran photostimulable au phosphore scanné par un module de balayage laser Molecular Dynamics PhosphorImager PSI. La distance détecteur / échantillon est réglée à 133 mm ce qui donne accès à des distances réticulaires comprises entre environ 3 et 110 Angströms. Les spectres sont enregistrés à différentes températures fixes.

[0027] Avec cette technique, les phases paracrystallines sont caractérisées par la présence, aux petits angles de diffraction, d'une série de plusieurs raies fines dues à des réflexions de Bragg et correspondant à des distances : d_1, d_2, \dots, d_n avec des rapports de distance $d_1/d_1, d_1/d_2, \dots, d_1/d_n$ qui sont caractéristiques de chaque type de phases, comme indiqué par exemple dans « La structure des colloïdes d'association, I. Les phases liquides cristallines des systèmes amphiphile-eau », V. Luzzati, H. Mustachi, A. Skoulios et F. Husson, Acta Cryst. (1960), 13, 660-667 ou dans Biochimica et Biophysica Acta (1990), 1031, p. 1 à 69, de J.M. Seddon. Ainsi, pour une phase de structure lamellaire et en particulier pour la phase paracrystalline de type lamellaire fluide généralement désignée par L_α et encore appelée phase lisse (« neat phase »), les rapports de distance sont égaux à : 1, 2, 3, 4, Pour la phase paracrystalline de type hexagonal directe généralement désignée par H1 ou E et encore appelée phase médian (« middle phase »), les rapports de distance sont égaux à : 1, $\sqrt{3}$, 2, $\sqrt{7}$, Aux grands angles de diffraction, les phases paracrystallines présentent une bande centrée sur une distance de l'ordre de 4,5 Angströms tandis que les phases cristallines conduisent à des raies fines.

Observations par microscopie optique

[0028] Les observations par microscopie optique en lumière polarisée contribuent également à l'identification des phases paracrystallines, en particulier lorsque

le nombre de raies observées par diffraction des Rayons-X est insuffisant pour établir sans ambiguïté la nature des phases paracrystallines en présence.

[0029] Les observations de microscopie optique en lumière polarisée sont effectuées par exemple à l'aide d'un microscope LABORLUX S (LEITZ) équipé d'un objectif de grossissement 10, d'un système de polariseurs croisés et d'une platine chauffante (METTLER FP80/FP82). L'échantillon est déposé entre lame et lamelle pour microscope, recouvert par une seconde lame et scellement de l'ensemble par l'intermédiaire d'un joint de Parafilm[®]. Les observations sont effectuées à diverses températures fixes ou en balayage de température à 2°C/min entre la température ambiante et environ 95°C.

[0030] Il est connu par exemple que les solutions micellaires isotropes sont non biréfringentes, que les phases paracrystallines de type cubique sont également non biréfringentes et que les phases paracrystallines de type lamellaire fluide, hexagonal directe ou inverse présentent en lumière polarisée diverses textures caractéristiques décrites par exemple dans « Textures des phases paracrystallines rencontrées dans les diagrammes d'équilibre : agents de surface, lipides, eau », F. La-champ et R.M. Vila, Revue Française des corps gras (1969), 2, 87-111 ou dans « the aqueous phase behavior of surfactants », Robert G. Laughlin Academic press, (1996)-p. 521-546.

Système tensioactif

[0031] Le système tensioactif utilisé dans la composition de l'invention et permettant d'obtenir l'apparition d'une phase paracrystalline lors d'un chauffage à au moins 30°C, comprend de préférence au moins un tensioactif hydrosoluble et au moins un tensioactif insoluble dans l'eau.

[0032] On entend par « tensioactif hydrosoluble » un tensioactif qui à une concentration de 20 g/l dans l'eau permutée à une température d'environ 25°C, donne une solution isotrope transparente.

[0033] On entend à l'inverse par « tensioactif insoluble dans l'eau » un tensioactif qui à une concentration de 20 g/l dans l'eau permutée à une température d'environ 25°C, donne une solution trouble indiquant la non solubilisation du tensioactif dans l'eau.

[0034] Le ou les tensioactifs insolubles dans l'eau forment une phase dispersée dans le milieu aqueux, cette phase dispersée comprenant tous les composés insolubles dans l'eau.

[0035] Le fait d'avoir des tensioactifs insolubles permet d'améliorer les qualités de la mousse obtenue et l'onctuosité de la composition.

Tensioactifs hydrosolubles

[0036] On peut utiliser tout tensioactif soluble dans l'eau. Il s'agit de préférence de tensioactifs moussants,

c'est-à-dire aptes à mousser en présence d'eau. Ce sont principalement des dérivés anioniques, non ioniques ou amphotères possédant des chaînes grasses suffisamment courtes pour que ces produits soient bien solubles à température ambiante dans le milieu solvant aqueux de la composition. On peut utiliser un tensioactif hydrosoluble ou un mélange de tels tensioactifs.

[0037] Comme tensioactifs hydrosolubles, on peut citer par exemple :

1. les tensioactifs anioniques

[0038] Selon un mode particulier de réalisation de l'invention, le système tensioactif utilisé comprend de préférence au moins un tensioactif anionique hydrosoluble, et plus particulièrement au moins un acide carboxylique ou un sel d'acide carboxylique hydrosoluble, sel qui est obtenu à partir de l'acide et d'une base. Les acides carboxyliques pouvant être utilisés sont des acides gras, c'est-à-dire des acides comportant une chaîne alkyle linéaire ou ramifiée, saturée ou insaturée, ayant de 6 à 16 atomes de carbone et de préférence 10 à 14 atomes de carbone. Les sels de tels acides gras constituent des savons. Le fait qu'un savon soit hydrosoluble ou non dépend à la fois de la longueur de la chaîne alkyle et du contre-ion constituant le sel. Comme sels, on peut utiliser par exemple les sels alcalins, les sels alcalino-terreux, les sels d'ammonium, les sels d' aminoalcools et les sels d'acides aminés, et notamment les sels de sodium, de potassium, de magnésium, de triéthanolamine, de N-méthylglucamine, de lysine et d'arginine. Les bases susceptibles d'être utilisées pour obtenir ces sels peuvent être par exemple les bases minérales comme les hydroxydes de métaux alcalins (hydroxyde de sodium et potasse), les hydroxydes de métaux alcalino-terreux (de magnésium) ou l'hydroxyde d'ammonium ou encore les bases organiques comme la triéthanolamine, la N-méthylglucamine, la lysine et l'arginine. L'acide carboxylique peut être en particulier l'acide laurique ou l'acide myristique.

[0039] Comme savon hydrosoluble, on peut citer par exemple les sels de potassium des acides gras en C10 à C14, et notamment le sel de potassium de l'acide laurique, le sel de potassium de l'acide myristique et leurs mélanges.

[0040] Le savon est généralement introduit dans la composition sous forme de la base d'une part et de l'acide gras d'autre part, la formation du sel se faisant in situ. Ainsi, quand le savon hydrosoluble est constitué du sel de potassium de l'acide laurique et/ou du sel de potassium de l'acide myristique, la composition peut contenir alors de l'acide laurique et/ou de l'acide myristique avec une quantité suffisante de potasse pour former les sels de potassium de l'acide laurique et/ou de l'acide myristique.

[0041] Comme autres tensioactifs anioniques pouvant être utilisés dans la composition de l'invention comme tensioactif hydrosoluble, on peut citer par exemple

les acides carboxyliques éthoxylés et leurs sels ; les sarcosinates et acylsarcosinates et leurs sels tels que le lauroyl sarcosinate de sodium ; les taurates et méthyltaurates et leurs sels ; les iséthionates et acyl iséthionates, produits de réaction d'acides gras comportant de 10 à 22 atomes de carbone, avec l'acide iséthionique, et leurs sels tels que l'iséthionate de sodium et le cocoyl-iséthionate de sodium ; les sulfosuccinates et leurs sels ; les alkylsulfates et alkyléthersulfates et leurs sels, notamment le laurylsulfate de sodium ou de triéthanolamine, et le lauryléther sulfate de sodium ou de potassium ; les monoalkyl- et dialkylesters d'acide phosphorique et leurs sels, tels que par exemple le mono- et dilauryl phosphate de sodium, le mono- et dilauryl phosphate de potassium, le mono- et dilauryl phosphate de triéthanolamine, le mono- et dimyristyl phosphate de sodium, le mono- et dimyristyl phosphate de potassium, le mono- et dimyristyl phosphate de diéthanolamine, le mono- et dimyristyl phosphate de triéthanolamine ; les alkane sulfonates et leurs sels ; les sels biliaires tels que les cholates, déoxycholates, taurocholates, taurodéoxycholates ; les lipoaminoacides et leurs sels tels que les acylglutamates mono- et di-sodiques ; les tensioactifs géminés, bipolaires, tels que décrits dans Surfactant Science series, vol.74 édité par Krister Homberg.

2. Tensioactifs amphotères et zwitterioniques

[0042] Comme tensioactifs amphotères ou zwitterioniques susceptibles d'être utilisés comme tensioactifs hydrosolubles, on peut citer par exemple les bétaïnes tels que la diméthylbétaïne, la coco-bétaïne et la cocoamidopropylbétaïne ; les sulfobétaïnes tels que la cocoamidopropylhydroxysultaïne ; les alkylamphoacétates tels que cocoamphodiacétate ; et leurs mélanges.

3. Tensioactifs non ioniques

[0043] Comme tensioactifs non ioniques susceptibles d'être utilisés comme tensioactifs hydrosolubles, on peut citer par exemple les éthers de polyols, comportant des chaînes grasses (8 à 30 atomes de carbone), tels que les éthers gras de sorbitol ou de glycérile oxyéthylénés ; les éthers et esters de polyglycérol ; les alcools gras polyoxyéthylénés qui sont des éthers formés d'unités d'oxyde d'éthylène et d'au moins une chaîne d'alcool gras ayant de 10 à 22 atomes de carbone, dont la solubilité dépend du nombre d'oxyde d'éthylène et de la longueur de la chaîne grasse ; par exemple, pour une chaîne grasse comportant 12 atomes de carbone, le nombre d'oxyde d'éthylène doit être supérieur à 7, et à titre d'exemple d'alcools gras polyoxyéthylénés, on peut citer les éthers d'alcool laurylique comportant plus de 7 groupes oxyéthylénés ; les alkyl-polyglucosides dont le groupe alkyle comporte de 1 à 14 atomes de carbone (alkyl-C₁-C₁₄ polyglucosides), comme par exemple le décylglucoside, le laurylglucoside, le cocoyl-

glucoside ; les alkylglucopyranosides et alkylthioglucopyranosides ; les alkyl maltosides ; les alcoyl N méthylglucamide. ; les esters de sorbitan polyoxyéthylénés qui comportent généralement de 1 à 100 unités d'éthylène glycol et de préférence de 2 à 40 unités d'oxyde d'éthylène (OE) ; les esters d'aminoalcools ; et leurs mélanges.

[0044] Le système tensioactif utilisé dans la composition de l'invention comprend une teneur en tensioactif (s) hydrosoluble(s) pouvant aller par exemple de 10 à 50 % en poids (en matière active), de préférence de 15 à 35 % en poids par rapport au poids total de la composition. Selon un mode préféré de réalisation de l'invention, le système tensioactif dans la composition de l'invention comprend au moins 10 % en poids, de préférence au moins 15 % en poids et mieux au moins 20 % en poids de tensioactif(s) hydrosoluble(s) par rapport au poids total de la composition.

Tensioactifs insolubles dans l'eau

[0045] Les tensioactifs insolubles dans l'eau apportent notamment la texture (consistance) de la composition finale. Par ailleurs, dans la plage de température comprise entre environ 25°C et 45°C, ces tensioactifs s'associent en partie avec les tensioactifs hydrosolubles pour contribuer à la formation de la phase paracristalline (de préférence hexagonale directe) qui est à l'origine de la stabilité du produit jusqu'à au moins 45°C.

[0046] Comme tensioactifs insolubles dans l'eau utilisés dans la composition selon l'invention, on peut citer notamment les acides carboxyliques et leurs sels insolubles dans l'eau, sels obtenus à partir de l'acide et d'une base, et donc les savons insolubles dans l'eau, c'est-à-dire les sels d'acides carboxyliques, comportant une chaîne alkyle linéaire ou ramifiée, saturée ou insaturée, ayant de 6 à 30 atomes de carbone et de préférence 12 à 22 atomes de carbone. Pour les dérivés comportant une seule chaîne grasse saturée, la chaîne comprend avantageusement de 12 à 32 atomes de carbone, de préférence de 14 à 22 atomes de carbone et mieux de 16 à 20 atomes de carbone. Pour les dérivés comportant une chaîne grasse monoinsaturée ou polyinsaturée ou ramifiée, la chaîne comprend avantageusement de 16 à 34 atomes de carbone et de préférence de 18 à 24 atomes de carbone.

[0047] Comme acide carboxylique, on peut citer notamment l'acide palmitique et l'acide stéarique.

[0048] Comme sels, on peut utiliser les sels alcalins, les sels alcalino-terreux, les sels d'ammonium, les sels d'aminoalcools et les sels d'aminoacides, et notamment les sels de sodium, de potassium, de magnésium, de triéthanolamine, de N-méthylglucamine, de lysine et d'arginine. Les bases susceptibles d'être utilisées pour obtenir ces sels peuvent être par exemple les bases minérales comme les hydroxydes de métaux alcalins (hydroxyde de sodium et potasse), les hydroxydes de métaux alcalino-terreux (de magnésium) ou l'hydroxyde

d'ammonium ou encore les bases organiques comme la triéthanolamine, la N-méthylglucamine, la lysine et l'arginine.

[0049] On peut citer par exemple comme savon insoluble, le sel de sodium des acides gras en C12 à C22 et le sel de potassium des acides gras en C16 à C22, et notamment le sel de potassium de l'acide palmitique et le sel de potassium de l'acide stéarique.

[0050] Le savon est généralement introduit dans la composition sous forme de la base d'une part et de l'acide gras d'autre part, la formation du sel se faisant in situ. Ainsi, quand le savon insoluble est constitué du sel de potassium de l'acide palmitique et/ou du sel de potassium de l'acide stéarique, la composition peut contenir alors de l'acide palmitique et/ou de l'acide stéarique avec une quantité suffisante de potasse pour former les sels de potassium de l'acide palmitique et/ou de l'acide stéarique.

[0051] Comme autres tensioactifs pouvant être utilisés dans la composition de l'invention comme tensioactif insoluble, on peut citer par exemple les tensioactifs insolubles non ioniques ou anioniques, comme les esters de glycéryle et d'acides gras comportant de 14 à 30 atomes de carbone, tels que le stéarate de glycéryle ; les alkylpolyglucosides dont le groupe alkyle comporte de 15 à 30 atomes de carbone (alkyl-C₁₅-C₃₀ polyglucosides), comme par exemple le cétoestéarylglucoside ; les dérivés de stérols et de phytostérols éventuellement oxyéthylénés ; les sels alcalins du cholestérol sulfate, et en particulier le sel de sodium ; les sels alcalins du cholestérol phosphate, et en particulier le sel de sodium ; les alcools gras polyoxyéthylénés comportant une chaîne oxyéthylénée ayant un petit nombre de groupes oxyéthylénés, et en particulier moins de 10 groupes oxyéthylénés ; les dialkylphosphates tels que les sels alcalins du dicétylphosphate, et en particulier les sels de sodium et de potassium ; les sels alcalins du dimyristylphosphate, et en particulier les sels de sodium et de potassium ; les lécithines ; les sphingomyélines ; les céramides et leurs mélanges.

[0052] Le système tensioactif utilisé dans la composition de l'invention comprend de préférence une teneur en tensioactif(s) insoluble(s) dans l'eau allant de 5 à 50 % (en matière active), et de préférence de 5 à 30 % en poids par rapport au poids total de la composition.

[0053] Le système tensioactif (tensioactifs hydrosolubles et insolubles) est présent dans la composition de l'invention en une quantité, en matière active, pouvant aller par exemple de 20 à 65 % en poids, et va de préférence de 30 à 65 % en poids et mieux de 40 à 60 % en poids par rapport au poids total de la composition. De préférence, le système tensioactif comprend une quantité de savon(s) hydrosoluble(s) d'au moins 10 % en poids par rapport au poids total de la composition, et une quantité totale de savons (hydrosolubles et insolubles) de préférence d'au moins 20 % en poids par rapport au poids total de la composition et allant de préférence de 30 à 40 % en poids par rapport au poids total

de la composition.

[0054] L'actif utilisé dans la composition de l'invention est choisi parmi les actifs antiséborrhéiques, les antimicrobiens et leurs mélanges. Comme actifs antiséborrhéiques, on peut citer par exemple les oestrogènes, la cyprotérone et son acétate, les rétinoïdes et arorétinoïdes (l'acide 13 cis rétinolique), le rétinol et ses dérivés, le soufre et les dérivés soufrés, le peroxyde de benzoyle, les dérivés de zinc tels que le sulfate de zinc, le chlorure d'aluminium, le disulfure de sélénium, les vitamines B, et leurs mélanges.

[0055] Les antimicrobiens peuvent être choisis parmi les antibiotiques, les antifongiques et leurs mélanges. Comme antimicrobiens, on peut citer par exemple les actifs suivants : dérivés de β -lactam, dérivés de quinolone, ciprofloxacine, norfloxacine, tétracycline et ses sels (chlorhydrate), érythromycine et ses sels (de zinc, estolate, stéarate), amikacine et ses sels (sulfate), 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxy diphenyl éther (triclosan), 3,4,4'-trichlorobanilide (tricarban), phénoxyéthanol, phénoxypropanol, phénoxyisopropanol, doxycycline et ses sels (chlorhydrate), capréomycine et ses sels (sulfate), chlorhexidine et ses sels (gluconate, chlorhydrate), chlorotétracycline et ses sels (chlorhydrate), oxytétracycline et ses sels (chlorhydrate), clindamycine et ses sels (chlorhydrate), éthambutol et ses sels (chlorhydrate), hexamidine et ses sels (iséthionate), métronidazole et ses sels (chlorhydrate), pentamidine et ses sels (chlorhydrate), gentamicine et ses sels (sulfate), kanamycine et ses sels (sulfate), linéomycine et ses sels (chlorhydrate), méthacycline et ses sels (chlorhydrate), méthénamine et ses sels (hippurate, mandelate), minocycline et ses sels (chlorhydrate), néomycine et ses sels (sulfate), netilmicine et ses sels (sulfate), paromomycine et ses sels (sulfate), streptomycine et ses sels (sulfate), tobramycine et ses sels (sulfate), miconazole et ses sels (chlorhydrate), amanfadine et ses sels (sulfate, chlorhydrate), octopirox, parachlorometaxylénol, nystatine, tolnaftate, zinc pyrithione, clotrimazole, acide salicylique, acide n-octanoyl-5 salicylique (ou acide capryloyl-salicylique), peroxyde de benzoyle, acide 3-hydroxybenzoïque, acide glycolique, acide lactique, acide 4-hydroxybenzoïque, acide acétylsalicylique, acide 2-hydroxybutanoïque, acide 2-hydroxypentanoïque, acide 2-hydroxyhexanoïque, acide phytique, acide N-acetyl-L-cystéine, acide lipoïque, acide azélaïque, acide arachidonique, ibuprofène, naproxène, hydrocortisone, acetaminophène, resorcinol, chlorhydrate de lidocaïne, sulfate de néocycline, octoxyglycérine, octanoylglycine (ou capryloylglycine), caprylylglycol (1,2-octanediol), acide 10-hydroxy-2-décanoïque, et leurs mélanges.

[0056] Certains de ces actifs peuvent avoir plusieurs fonctions. Par exemple, l'acide salicylique peut également favoriser la desquamation des cellules épidermiques, et contribuer à une normalisation de l'étalement du sébum sur la peau.

[0057] L'acide azélaïque, outre son activité antibactérienne sur les peaux acnéiques, inhibe la prolifération

des kératinocytes, diminue le taux des acides gras libres dans les sécrétions sébacées et possède une activité anti-inflammatoire.

[0058] Selon un mode préféré de réalisation de l'invention, les actifs utilisés sont l'acide salicylique et ses sels, l'acide n-octanoyl-5 salicylique, le peroxyde de benzoyle, le triclosan, le phénoxyéthanol, l'octoxyglycérine, l'octanoylglycine, l'acide 10-hydroxy-2-décanoïque, le caprylylglycol, l'acide azélaïque, le rétinol, et les vitamines B et notamment la niacinamide. Ces actifs peuvent être utilisés seuls ou en association.

[0059] La quantité d'actif(s) dans la composition selon l'invention dépend de l'actif ou des actifs utilisés et elle peut varier dans une large mesure. Elle peut aller par exemple de 0,05 à 20 % en poids et de préférence de 0,1 à 10 % en poids par rapport au poids total de la composition.

[0060] La composition peut contenir en outre un ou plusieurs agents anti-inflammatoires et/ou anti-irritants tels que les acides ursolique et oléanolique et leurs sels (commercialisés par la société Boehringer sous la dénomination « Ursolic oleanic acid »), l'extrait de racine de paeonia suffruticosa (commercialisé par Ichimaru Pharcos sous la dénomination « Botampi extract powder »), l'huile de calophyllum, l'acide 18 bêta glycyrrhétinique et son sel de zinc, l'huile de tamanu, le laminaria saccharina extract (commercialisé par Secma sous la dénomination « phlorogine »). Ces actifs peuvent être présents en une quantité allant de 0,01 à 10 % en poids par rapport au poids total de la composition.

[0061] Le milieu aqueux des crèmes moussantes de l'invention peut contenir, outre l'eau, un ou plusieurs solvants choisis parmi les alcools inférieurs comportant de 1 à 6 atomes de carbone, tels que l'éthanol ; les polyols tels que la glycérine ; les glycols comme le butylène glycol, l'isoprène glycol, le propylène glycol, les polyéthylène glycols tels que le PEG-8 ; le sorbitol ; les sucres tels que le glucose, le fructose, le maltose, le lactose, le sucrose ; et leurs mélanges. La quantité de solvant (s) dans la composition de l'invention peut aller de 0,5 à 30 % en poids et de préférence de 5 à 20 % en poids par rapport au poids total de la composition.

[0062] Pour obtenir des compositions plus ou moins fluides, on peut incorporer dans les compositions de l'invention un ou plusieurs agents épaississants, notamment des polymères, dans des concentrations préférentielles allant de 0,05 à 2 % en poids par rapport au poids total de la composition.

[0063] On peut citer comme exemples d'épaississants :

- les biopolymères polysaccharidiques comme la gomme de xanthane, la gomme de guar, les alginate, les celluloses modifiées ;
- les polymères synthétiques tels que les polyacryliques comme le CARBOPOL 980 commercialisé par la société GOODRICH, les copolymères acrylate/acrylonitrile tels que le HYPAN SS201 commercia-

- lisé par la société KINGSTON ;
- les épaississants inorganiques tels que les smectites, les hectorites modifiées ou non telles que les produits BENTONE commercialisés par la société RHEOX, les produits LAPONITE commercialisés par la société SOUTHERN CLAY PRODUCTS, le produit VEEGUM HS commercialisé par la société R.T. VANDERBILT ;
- leurs mélanges.

[0064] Les compositions selon l'invention constituent des crèmes plus ou moins fluides, dont les modules IG^* ont, à la température de 25°C, des valeurs allant de 10^2 à 10^5 Pa et dont les angles de perte δ allant de 10 à 45° pour des fréquences allant de 10^{-2} à 10 Hz.

[0065] IG^* et δ sont les paramètres viscoélastiques utilisés pour mesurer les propriétés physiques des fluides viscoélastiques comme expliqué dans « An introduction to rheology » de H.A. BARNES, J.F. HUTTON, K. WALTERS, pages 46 à 54, (Ed. Elsevier - 1989).

[0066] IG^* est le module du module complexe G^* (complex modulus) et δ est l'angle de perte (loss angle). G' et G'' sont les composantes de G^* : $G^* = G' + iG''$. G' et G'' sont respectivement le module de conservation (storage modulus) et le module de perte (loss modulus) et i est égal à $(-1)^{1/2}$. Les composantes G' et G'' du module complexe sont obtenues à partir de la relation entre la contrainte sinusoïdale (oscillatory stress) et la déformation sinusoïdale (oscillatory strain).

[0067] Les mesures rhéologiques de IG^* et δ sont effectuées généralement en utilisant un Rhéomètre Haake RS150, à la température de 25°C, avec des corps de mesure de géométrie cône - plan, le diamètre du cône et la dimension du plan étant de 60 mm et l'angle du cône de 2° et l'entrefer entre le cône et le plan étant de 0,1 mm.

[0068] Pour faire des mesures dynamiques de viscoélasticité (oscillatory measurements), on détermine d'abord le domaine viscoélastique linéaire, en soumettant l'échantillon à des contraintes sinusoïdales d'amplitudes croissantes et de fréquence constante. Les modules sont reportés en fonction de l'amplitude de la contrainte (amplitude of stress) ou de l'amplitude de la déformation (strain) afin de déterminer les limites du domaine viscoélastique linéaire. Après avoir identifié le domaine viscoélastique linéaire, des mesures dynamiques sont réalisées dans la zone viscoélastique linéaire, pour une valeur de déformation constante située dans le domaine viscoélastique linéaire et à fréquence variable. Le rhéomètre Haake RS150 peut couvrir une gamme de fréquences variant de 0,01 à 10 Hz (soit 0,063 à 62,8 rad/sec).

[0069] A partir des valeurs des amplitudes de la contrainte τ_0 , de la déformation γ_0 , ainsi qu'à partir du déphasage δ , on établit les relations suivantes :

$$IG^*I = \frac{\tau_0}{\gamma_0}$$

$$G' = IG^*I \cos \delta$$

$$G'' = IG^*I \sin \delta$$

$$G^* = G' + iG''$$

[0070] Les compositions de l'invention peuvent contenir aussi des adjuvants habituellement utilisés dans le domaine des nettoyeurs moussants comme les polymères cationiques du type polyquaternium, qui apportent douceur et onctuosité à la crème moussante. Ces polymères cationiques peuvent être choisis de préférence parmi les polymères suivants :

- Polyquaternium 5 tel que le produit MERQUAT 5 commercialisé par la société CALGON ;
- Polyquaternium 6 tel que le produit SALCARE SC 30 commercialisé par la société CIBA, et le produit MERQUAT 100 commercialisé par la société CALGON ;
- Polyquaternium 7 tel que les produits MERQUAT S, MERQUAT 2200 et MERQUAT 550 commercialisés par la société CALGON, et le produit SALCARE SC 10 commercialisé par la société CIBA ;
- Polyquaternium 10 tel que le produit Polymer JR400 commercialisé par la société AMERCHOL ;
- Polyquaternium 11 tel que les produits GAFQUAT 755, GAFQUAT 755N et GAFQUAT 734 commercialisés par la société ISP ;
- Polyquaternium 15 tel que le produit ROHAGIT KF 720 F commercialisé par la société ROHM ;
- Polyquaternium 16 tel que les produits LUVIQUAT FC905, LUVIQUAT FC370, LUVIQUAT HM552 et LUVIQUAT FC550 commercialisés par la société BASF ;
- Polyquaternium 22 tel que le produit MERQUAT 280 commercialisé par la société CALGON ;
- Polyquaternium 28 tel que le produit STYLEZE CC10 commercialisé par la société ISP ;
- Polyquaternium 39 tel que le produit MERQUAT PLUS 3330 commercialisé par la société CALGON ;
- Polyquaternium 44 tel que le produit LUVIQUAT CARE commercialisé par la société BASF ;
- Polyquaternium 46 tel que le produit LUVIQUAT HOLD commercialisé par la société BASF ;
- Polyquaternium 47 tel que le produit MERQUAT 2001 commercialisé par la société CALGON.

[0071] On peut aussi utiliser comme polymère cationique les guar cationiques telles que le produit JA-

GUAR commercialisé par la société RHODIA.

[0072] En outre, les compositions de l'invention peuvent contenir des adjuvants habituellement utilisés dans le domaine cosmétique ou dermatologique, choisis parmi les huiles, les actifs, les parfums, les conservateurs, les séquestrants (EDTA), les pigments, les nacres, les charges minérales ou organiques telles que le talc, le kaolin, les poudres de silice ou de polyéthylène, les colorants solubles, les filtres solaires. Les quantités de ces différents adjuvants sont celles classiquement utilisées dans le domaine considéré, et par exemple de 0,01 à 20 % du poids total de la composition. Ces adjuvants ainsi que leurs concentrations doivent être tels qu'ils ne modifient pas la propriété recherchée pour la composition de l'invention.

[0073] Comme exemple d'huile, on peut citer les huiles d'origine végétale (jojoba, avocat, sésame, tournesol, maïs, soja, carthame, pépins de raisin), les huiles minérales (vaseline, isoparaffines éventuellement hydrogénées), les huiles de synthèse (myristate d'isopropyle, octanoate de cétéaryle, polyisobutylène, palmitate d'éthylhexyle, alkyl benzoates), les huiles de silicone volatiles ou non volatiles telles que les polydiméthylsiloxanes (PDMS) et les cyclodiméthylsiloxanes ou cyclo-méthicones, et les huiles fluorées ou fluorosiliconées, ainsi que les mélanges de ces huiles. La quantité d'huiles ne doit pas modifier la propriété recherchée pour la composition de l'invention : elle est d'au maximum 15 % en poids et mieux d'au maximum 10 % en poids par rapport au poids total de la composition, et elle va de préférence de 0,1 à 5 % en poids et mieux de 0,1 à 3 % en poids par rapport au poids total de la composition.

[0074] Comme actifs, on peut citer par exemple les hydratants et, par exemple les hydrolysats de protéines et les polyols tels que la glycérine, les glycols comme les polyéthylène glycols, et les dérivés de sucre ; les extraits naturels ; les oligomères procyanidoliques ; les vitamines ; l'urée ; la caféine ; les dépigmentants tels que l'acide kojique et l'acide caféique ; les alpha-hydroxyacides tels que l'acide lactique et l'acide glycolique ; les rétinoïdes ; les filtres solaires ; les extraits d'algues, de champignons, de végétaux, de levures, de bactéries ; les protéines hydrolysées, partiellement hydrolysées ou non hydrolysées, les enzymes, le coenzyme Q10 ou ubiquinone, les hormones, les vitamines et leurs dérivés, les flavonoides et isoflavones, et leurs mélanges.

[0075] Les compositions selon l'invention peuvent constituer notamment des crèmes moussantes pour application topique, utilisées en particulier dans les domaines cosmétique ou dermatologique, comme produits de nettoyage ou de démaquillage de la peau (corps ou visage y compris yeux), du cuir chevelu et/ou des cheveux. Une composition à usage topique contient un milieu physiologiquement acceptable, c'est-à-dire compatible avec la peau, les muqueuses, le cuir chevelu, les yeux et/ou les cheveux. Elle peut constituer plus particulièrement une composition de nettoyage des peaux

grasses et/ou à tendance acnéique. Elle peut aussi être utilisée pour le nettoyage des peaux acnéiques avant un éventuel traitement ultérieur.

[0076] Un autre objet de l'invention consiste en l'utilisation cosmétique de la composition telle que définie ci-dessus, comme produits de nettoyage et/ou de démaquillage des peaux grasses et/ou à tendance acnéique.

[0077] L'invention a aussi pour objet l'utilisation d'une composition telle que définie ci-dessus, pour la préparation d'une composition destinée au nettoyage des peaux acnéiques.

[0078] L'invention a encore pour objet un procédé cosmétique de nettoyage des peaux grasses et/ou à tendance acnéique, caractérisé par le fait qu'on applique la composition de l'invention, sur la peau, en présence d'eau, qu'on masse pour former une mousse et qu'on élimine la mousse formée par rinçage à l'eau.

[0079] Les exemples qui suivent servent à illustrer l'invention sans toutefois présenter un caractère limitatif. Les quantités indiquées sont en % en poids sauf mention contraire.

Exemple selon l'invention : crème moussante de nettoyage des peaux grasses

[0080]

- Conservateur 0,4 %
- Tétrasydium EDTA 0,2 %
- Hydroxyde de potassium 7 %
- glycérine 7 %
- PEG-8 7 %
- Acide laurique 3 %
- Acide myristique 20 %
- Acide palmitique 3 %
- Acide stéarique 3 %
- Stéarate de glycéryle (nom CTFA : Glycéryl stéarate SE) 5 %
- cocoyl-glucoside (à 50 % en matière active) 2 %
(soit 1 % de matière active)
- Acide n-octanoyl-5-salicylique (Mexoryl SAB commercialisé par la société CHIMEX) 0,3 %
- Eau qsp 100 %

[0081] Mode opératoire : La phase aqueuse constituée des ingrédients hydrosolubles (eau, conservateurs, EDTA, glycérine, PEG-8) est portée à 80°C. La phase grasse constituée des acides gras, du glycéryl stéarate et de l'acide n-octanoyl-5 salicylique est chauffée à 80°C et ajoutée sous agitation à la phase aqueuse. Le cocoyl glucoside est ensuite additionné puis la potasse solubilisée dans une partie de l'eau. L'agitation est maintenue 10 minutes à 80°C, puis l'ensemble est refroidi sous agitation.

[0082] La composition moussante obtenue est onctueuse et douce.

[0083] Les tensioactifs hydrosolubles constitués des

sels de potassium des acides laurique et myristique, et du cocoyl-glucoside représentent 29,5 % de la composition, tandis que les tensioactifs insolubles dans l'eau, constitués des sels de potassium des acides palmitique et stéarique et du glyceryl stéarate représentent 12,5 % de la composition. La composition contient ainsi au total 42 % de tensioactifs dont 36 % de savons (KOH + acides laurique, myristique, palmitique et stéarique). Les savons hydrosolubles représentent 28,5 % du poids de la composition.

[0084] La composition obtenue a l'aspect d'une crème blanche à température ambiante ; elle se transforme en gel translucide extrêmement visqueux entre 35 et 40°C ; ce gel existe jusqu'à 75-80°C, température à laquelle la composition se fluidifie. Revenu à température ambiante de 25°C, ce gel a de nouveau l'aspect d'une crème homogène.

[0085] La stabilité de cette crème est parfaite à 4°C, à la température ambiante et à 45°C pendant au moins deux mois.

[0086] Pour cette crème, les valeurs de IG*I sont de 2900 Pa à 0,01 Hz et de 25000 Pa à 1 Hz, et les valeurs de δ sont de 45° à 0,01 Hz et de 40° à 1 Hz.

Caractérisation :

[0087]

- A 25°C, la crème est constituée d'une phase micellaire qui a pu être isolée par centrifugation (pendant une heure à 64 000 g, soit à 30 000 tours/minute, avec une centrifugeuse 3K30 Sigma équipée d'un rotor 1210) et d'une phase cristalline. La phase micellaire est transparente, fluide et non biréfringente en lumière polarisée, en diffraction des rayons-X. Cette phase conduit à une raie large aux petits angles centrée autour d'une distance $d = 49,8$ Å et à une bande aux grands angles centrée autour d'une distance $d = 4,64$ Å.

Sur la base des mesures réalisées sur la crème complète, la phase cristalline présente une température de fusion : $T_m = 42^\circ\text{C}$ en DSC et est caractérisée en diffraction des rayons-X par 3 raies fines aux petits angles correspondant à des distances $d = 42,7$; 21,4 et 14,2 Å et 7 raies fines aux grands angles correspondant à $d = 4,37$; 4,27; 4,19; 3,92; 3,68; 3,35 et 3,07 Å.

- A 35°C, la crème est homogène à l'échelle macroscopique et constituée du mélange d'une phase hexagonale caractérisée en diffraction des rayons-X par 2 raies fines aux petits angles correspondant à des distances $d = 48,7$ et 24,3 Å et une phase cristalline caractérisée par 3 raies fines aux petits angles correspondant à $d = 42,0$; 21,0 et 14,0 Å et 3 raies fines aux grands angles correspondant à $d = 4,29$; 3,92 et 3,09 Å.

- A 45°C, la crème est homogène à l'échelle macroscopique et constituée d'un mélange contenant une phase hexagonale caractérisée en diffraction des rayons-X par 2 raies fines aux petits angles correspondant à des distances $d = 49,6$ et 28,7 Å et une phase lamellaire fluide caractérisée par 1 raie fine aux petits angles correspondant à $d = 45,0$ Å. Aux grands angles on observe une bande centrée autour de 4,60 Å en accord avec la présence de phases para-cristallines.

- A 55°C, la crème est homogène à l'échelle macroscopique et constituée d'un mélange contenant une phase hexagonale caractérisée en diffraction des rayons-X par 2 raies fines aux petits angles correspondant à des distances $d = 47,7$ et 27,5 Å et d'une phase lamellaire fluide caractérisée par 1 raie faible fine aux petits angles correspondant à $d = 36,5$ Å. Aux grands angles on observe une bande centrée autour de 4,70 Å en accord avec la présence de phases paracristallines.

Exemple comparatif :

[0088]

- Conservateur 0,4 %
- Tétrahydroxyéthylène diamine 0,2 %
- Hydroxyde de potassium 4 %
- Glycérine 7 %
- PEG-8 7 %
- Acide laurique 3 %
- Acide myristique 3 %
- Acide palmitique 8,7 %
- Acide stéarique 8,7 %
- Stéarate de glycéryle (nim CTFA : Glyceryl stéarate SE) 0,75 %
- Lauroyl sarcosinate de sodium (à 30 % en matière active) 21,8 %
(soit environ 7 % de matière active)
- Acide n-octanoyl-5-salicylique (Mexoryl SAB commercialisé par la société CHIMEX) 0,3 %
- Eau qsp 100 %

[0089] Le mode opératoire est le même que dans l'exemple 1.

[0090] Les tensioactifs hydrosolubles constitués des sels de potassium des acides laurique et myristique, et du lauroyl sarcosinate de sodium représentent 14 % de la composition, tandis que les tensioactifs insolubles dans l'eau, constitués des sels de potassium des acides palmitique et stéarique et du glyceryl stéarate représentent 21,15 % de la composition. La composition contient donc 35,15 % de tensioactifs dont 27,4 % de savons (KOH + acides laurique, myristique, palmitique et stéarique). Les savons hydrosolubles représentent 7 % en poids de la composition.

[0091] La composition obtenue a l'aspect d'une crème

me blanche à température ambiante. Cette composition est bien stable à 4°C, mais elle est instable à 45°C où elle se sépare en deux phases. Revenue à la température ambiante, elle est hétérogène.

- A 25°C, la crème est constituée d'une phase micellaire qui a pu être isolée par centrifugation (pendant une heure à 64 000 g, soit à 30 000 tours/minute avec une centrifugeuse 3K30 Sigma équipée d'un rotor 1210) et d'une phase cristalline.

La phase micellaire est transparente, fluide et non biréfringente en lumière polarisée. En diffraction des rayons-X cette phase conduit à une raie large aux petits angles centrée autour d'une distance $d = 50,0$ Å et à une bande aux grands angles centrée autour d'une distance $d = 4,53$ Å.

Sur la base des mesures réalisées sur la crème complète, la phase cristalline présente une température de fusion : $T_m = 45^\circ\text{C}$ en DSC et est caractérisée en diffraction des rayons-X par 5 raies fines aux petits angles correspondant à des distances $d = 49,0; 24,1; 16,0; 12,2$ et $9,64$ Å et 6 raies fines aux grands angles correspondant à $d = 4,37; 4,28; 4,20; 3,94; 3,66$ et $3,08$ Å.

- A 50°C, il se produit une démixtion macroscopique de la crème en deux phases : Une phase supérieure de type lamellaire fluide qui présente en lumière polarisée une texture caractéristique de type : « Croix de Malte » et conduit en diffraction des rayons-X à une raie fine aux petits angles correspondant à $43,3$ Å et à une bande aux grands angles centrée autour de $4,78$ Å.

Une phase inférieure de type solution micellaire, qui est fluide, transparente et non biréfringente en lumière polarisée et caractérisée en diffraction des rayons-X par une raie diffuse aux petits angles correspondant à $d = 58,0$ Å et une bande aux grands angles centrée autour de $4,80$ Å.

La différence essentielle entre la composition de l'exemple selon l'invention et la composition de l'exemple comparatif porte sur l'aspect macroscopique au-delà de 45°C : la composition selon l'invention donne un système homogène alors que la composition de l'exemple comparatif aboutit à une démixtion.

Pour la composition selon l'invention de l'exemple 1, le système est constitué au-delà de 45°C , d'une phase lamellaire en mélange avec une phase hexagonale directe dont la forte viscosité permet d'éviter la démixtion macroscopique.

Pour la composition de l'exemple comparatif, le système est constitué au-delà de 45°C , d'une phase lamellaire en mélange avec une phase micellaire dont la faible viscosité ne permet pas d'éviter la démixtion macroscopique, aboutissant à une composition hétérogène après retour à la température ambiante.

Exemple 2 : crème moussante de nettoyage des peaux grasses

[0092]

- 5 - Conservateur 0,4 %
- Tétrasodium EDTA 0,2 %
- Hydroxyde de potassium 7 %
- glycérine 7 %
- 10 - PEG-8 7 %
- Acide laurique 3 %
- Acide myristique 20 %
- Acide palmitique 3 %
- Acide stéarique 3 %
- 15 - Stéarate de glycéryle (nom CTFA : glycéryl stéarate SE) 5 %
- cocoyl-glucoside (à 50 % en matière active) 2 %
(soit 1 % de matière active)
- 20 - Acide azélaïque (EMÉROX 1144 AZELAIC ACID commercialisé par la société COGNIS) 5 %
- Eau qsp 100 %

[0093] Mode opératoire : La phase aqueuse constituée des ingrédients hydrosolubles (eau, conservateurs, EDTA, glycérine, PEG-8, acide azélaïque) est portée à 80°C . La phase grasse constituée des acides gras et du glycéryl stéarate est chauffée et ajoutée sous agitation à la phase aqueuse. Le cocoyl glucoside est ensuite additionné puis l'hydroxyde de potassium solubilisé dans une partie de l'eau. L'agitation est maintenue 10 minutes à 80°C , puis l'ensemble est refroidi sous agitation.

[0094] On obtient les mêmes caractéristiques que pour l'exemple 1.

Revendications

- 40 1. Composition moussante constituant une crème pour application topique, comprenant dans un milieu aqueux, (1) un système tensioactif tel qu'au moins une phase paracristalline de type hexagonale directe et/ou cubique apparaisse quand la température augmente au-delà de 30°C et que cette phase paracristalline reste présente jusqu'à au moins 45°C , (2) un actif choisi parmi les actifs anti-séborrhéiques et les antimicrobiens.
- 45 2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que la phase paracristalline comprend au moins une phase hexagonale directe.
- 50 3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle a un module $|G'|$ allant, à la température de 25°C , de 10^2 à 10^5 Pa et un angle de perte δ allant de 10 à 45° pour des fréquences allant de 10^{-2} à 10 Hz.
- 55

4. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée en ce que** le système tensioactif comprend au moins un tensioactif hydrosoluble et au moins un tensioactif insoluble dans l'eau. 5
5. Composition selon la revendication précédente, **caractérisée en ce que** le système tensioactif comprend au moins un tensioactif anionique hydrosoluble. 10
6. Composition selon la revendication précédente, **caractérisée en ce que** le tensioactif anionique hydrosoluble est choisi parmi les acides carboxyliques et leurs sels, les acides carboxyliques éthoxylés et leurs sels, les sarcosinates et acylsarcosinates et leurs sels, les taurates et méthyltaurates et leurs sels, les iséthionates et acyl iséthionates et leurs sels, les sulfosuccinates et leurs sels, les alkylsulfates et alkyléthersulfates et leurs sels, les monoalkyl- et dialkylesters d'acide phosphorique et leurs sels, les alkane sulfonates et leurs sels, les sels biliaires, les lipoaminoacides et leurs sels, les tensioactifs géminés et leurs mélanges. 15
7. Composition selon la revendication 4, **caractérisée en ce que** le tensioactif hydrosoluble est un tensioactif amphotère ou zwitterionique choisi parmi les bétaines, les sulfobétaines, les alkylamphoacétates et leurs mélanges. 20
8. Composition selon la revendication 4, **caractérisée en ce que** le tensioactif hydrosoluble est un tensioactif non ionique choisi parmi les éthers de polyols, les éthers et esters de polyglycérol, les alcools gras polyoxyéthylénés, les alkyl-C₁-C₁₄ polyglucosides, les alkyl glucopyranosides et alkylthioglucopyranosides, les alkyl maltosides, les alcoyl N méthylglucamide, les esters de sorbitan polyoxyéthylénés, les esters d'aminoalcools et leurs mélanges. 25
9. Composition selon la revendication 4, **caractérisée en ce que** le tensioactif insoluble dans l'eau est choisi parmi les acides carboxyliques et leurs sels ; les esters de glycérile et d'acides gras ; les alkyl-C₁₅-C₃₀ polyglucosides ; les dérivés de stérols et de phytostérols éventuellement oxyéthylénés ; les sels alcalins du cholestérol sulfate ; les sels alcalins du cholestérol phosphate ; les alcools gras polyoxyéthylénés ; les dialkylphosphates ; les lécithines ; les sphingomyélines ; les céramides et leurs mélanges. 30
10. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée en ce que** le système tensioactif est présent en une quantité, en matière active, allant de 20 à 65 % en poids par rapport au poids total de la composition. 35
11. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée en ce que** le système tensioactif comprend de 10 à 50 % en poids de tensioactif(s) hydrosoluble(s) par rapport au poids total de la composition. 40
12. Composition selon la revendication précédente, **caractérisée en ce que** le système tensioactif comprend au moins 15 % en poids de tensioactif(s) hydrosoluble(s) par rapport au poids total de la composition. 45
13. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée en ce que** le système tensioactif comprend au moins 10 % en poids de savon(s) hydrosoluble(s) par rapport au poids total de la composition. 50
14. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée en ce que** le système tensioactif comprend de 5 à 50 % en poids de tensioactif(s) insoluble(s) dans l'eau par rapport au poids total de la composition. 55
15. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée en ce que** le système tensioactif comprend une quantité totale de savons d'au moins 20 % en poids par rapport au poids total de la composition.
16. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée en ce que** l'actif est choisi parmi les oestrogènes, la cyprotérone et son acétate, les rétinoïdes et arorétinoïdes, le rétinol et ses dérivés, le soufre et les dérivés soufrés, le peroxyde de benzoyle, les dérivés de zinc, le chlorure d'aluminium, le disulfure de sélénium, les vitamines B, les dérivés de β-lactam, les dérivés de quinolone, la ciprofloxacine, la norfloxacine, la tétracycline et ses sels, l'érythromycine et ses sels, l'amikacine et ses sels, le triclosan, le tricarban, le phénoxyéthanol, le phénoxypropanol, le phénoxyisopropanol, la doxycycline et ses sels, la capréomycine et ses sels, la chlorexidine et ses sels, la chlorotétracycline et ses sels, l'oxytétracycline et ses sels, la clindamycine et ses sels, l'éthambutol et ses sels, l'hexamidine et ses sels, le métronidazole et ses sels, la pentamidine et ses sels, la gentamicine et ses sels, la kanamycine et ses sels, la linéomycine et ses sels, la méthacycline et ses sels, la méthénamine et ses sels, la minocycline et ses sels, la néomycine et ses sels, la netilmicine et ses sels, la paromomycine et ses sels, la streptomycine et ses sels, la tobramycine et ses sels, le miconazole et ses sels, l'amanfadine et ses sels, l'octopirox, le parachlorometaxylénol, la nystatine, le tolnaftate, la zinc pyrithione, le clotrimazole, l'acide salicylique, l'acide n-octanoyl-5 salicylique, l'acide

3-hydroxybenzoïque, l'acide glycolique, l'acide lactique, l'acide 4-hydroxybenzoïque, l'acide acétylsalicylique, l'acide 2-hydroxybutanoïque, l'acide 2-hydroxypentanoïque, l'acide 2-hydroxyhexanoïque, l'acide phytique, l'acide N-acetyl-L-cystéine, l'acide lipoi- 5
 que, l'acide azélaïque, l'acide arachidonique, l'ibuprofène, le naproxène, l'hydrocortisone, l'acetaminophène, le résorcinol, le chlorhydrate de lidocaïne, le sulfate de néocycine, l'octoxyglycérine, l'octa- 10
 noylglycine, le caprylylglcol, l'acide 10-hydroxy-2-décanoïque, et leurs mélanges.

17. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée en ce que** la quantité d'actif(s) va de 0,05 à 20 % en poids par rapport au poids total de la composition. 15
18. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée en ce qu'elle** comprend en outre au moins un ou plusieurs agents anti-inflammatoires et/ou anti-irritants. 20
19. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée en ce qu'elle** comprend au moins un solvant choisi parmi les alcools inférieurs ; les polyols ; les sucres et leurs mélanges. 25
20. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée en ce qu'elle** comprend au moins un agent épaississant. 30
21. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée en ce qu'elle** constitue une composition de nettoyage des peaux grasses et/ou à tendance acnéique. 35
22. Utilisation cosmétique d'une composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 20, comme produit de nettoyage et/ou produit de démaquillage des peaux grasses et/ou à tendance acnéique. 40
23. Utilisation d'une composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 20, pour la préparation d'une composition destinée au nettoyage des peaux acnéiques. 45
24. Procédé cosmétique de nettoyage des peaux grasses et/ou à tendance acnéique, **caractérisé en ce qu'on** applique la composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 20, sur la peau, en présence d'eau, qu'on masse pour former une mousse et qu'on élimine la mousse formée par rinçage à l'eau. 50

55